

Kalveholm, Rødsand

Observatør 1997/98/99/00/01/02: Finn Jensen, 2002: Jørn Hansen, 2006/07/08/09: Lars Munk, 2006/07/08/09/14/16/17/18: Michael Thelander, 2008: Ole Friis Larsen, 2009: Ulla Brandt

Vurderet antal ynglepar

Optællingsdato	23/5 1997	27/5 1998	25/5 1999	9/5 2000	14/5 2001	16/5 2002	Ikke optalt i 2003-05	31/5 2006	31/5 2007	5/6 2008	5/6 2009	21/6 2014	3/6 2016	9/6 2017	8/6 2018
Svartbag			1	1**	2**	3***		1	4	2	4	1-2	1-2	1-2	1-2
Sølvmåge	118	190	112	70*	90*	124***		250	212	25-40	40-60	40-60	40-60	30-50	40-50
Stormmåge					1*				1	2-5	4-6	2-4	8-12	12-14	5-10
Fjordterne														0-3	
Havterne		1	2			1*									
Knopsvane	3	3	3	3	4	1		1	1	1	1	2	1	1	
Grågås			2	3	4	1				7					
Bramgås		2 ?													
Toppet Skallesluger														1	1
Gråand		1	2	1	1	1		2	2	3	4	0-2	3	3-4	3-4
Knarand		1			2			1			2	0-1		1	1
Skeand						1		1	2	3	1-2		0-1		
Ederfugl	17	75	63	89	57	84		8		3			+	+	+
Strandskade		4		1	3	1		4	1	2	3	1-2	2	2-3	2
Rødben									1			1	2		1
Vibe										1	1	1	1	1	1
St. Præstekrave				1								1	1		
Gråkrage					1										
Engpiber														+	+

Bemærkninger 2014:

Øen blev gennemgået og opflyvende og rastende fugle blev optalt. Kun reder af Knopsvane blev optalt præcist. En sen optælling. Der er udsat ca. 50 får. Enkelte områder er nedgræsset mens øvrige dele er med høj vegetation.

Bemærkninger 2016:

Der yngede muligvis 1-2 par Fjordterne. Arten yngler på naboholmene Tjørneholm og Hylleholm. Fra land blev der på holmen set Havørn 2 ad., Bramgås 3 og 1 fouragerende Rørhøg.

Bemærkninger 2018:

Øvrige obs: Klyde 1, Grågås græsser på holmen, ingen får- eller- kreaturafgræsning på holmen.

Kommentar:

Høj vegetation over det meste af øen. Kun sydlig spids kan være redested for terner, men høj risiko for oversvømmelse.



Får på holmen i 2014



Høj vegetation på en stor del af holmen



Redested for terner på Kalveholm, men høj risiko for oversvømmelse